GUIA DE AVES DE LA ISLA JECHICA



Fernanda Neder

PICAFLOR
(PORTADA)
Sephanoides sephaniodes
GREEN-BACKED FIRECROWN



Descripción: Mide 11 cm.
Cabeza verde con corona roja anaranjada iridiscente. Mancha blanca postocular. Garganta verde con manchitas bronceadas brillantes. Por encima verde con brillo bronceado. Por debajo verde grisáceo. Flancos y cola verde bronceados. Pico negro recto.
Hembra: Sin la corona roja.
Hábitat: Bosques, quebradas, jardines, lugares floridos.
Hábitos: Se alimenta del polen y néctar de las flores que obtiene manteniéndose fijo en el aire con un aleteo rapidísimo y metiendo su pico delgado y largo dentro de ellas. Anida en ramas de árboles, el nido es colgante lo construye con pastos, musgos y otros vegetales blandos muy bien trabajados y moldeados. Pone 2 huevos blancos.

UBICACIÓN ISLA JECHICA

Región de Aysén
44º25' Latitud Sur y 73º51' Longitud Weste
Chile



INDICE

Albatros de ceja negra	39	Gaviota dominicana	52
Bandurria	51	Golondrina chilena	19
Blanquillo	34	Huairavo	46
Cachaña	13	Jilguero	16
Cachudito	20	Jote de cabeza colorada	43
Canquén	48	Jote de cabeza negra	42
Carpinterito	11	Lile	50
Carpintero	37	Peuquito	17
Chercán	10	Picaflor	2
Chercán de las vegas	9	Pingüino de magallanes	32
Chincol	7	Pitío	30
Chuncho	22	Quetru no volador	28
Churrete chico	49	Rayadito	8
Churrín del sur	6	Tiuque	35
Colegial	36	Torcaza	18
Colilarga	15	Tordo	25
Comesebo grande	12	Traro	21
Cometocino patagónico	26	Viudita	24
Cormorán imperial	40	Yeco	41
Diucón	23	Zarapito	31
Fardela negra	38	Zorzal	29
Fío-fío	14		
Garza chica	45		
Garza cuca	47	Ubicación Isla Jechica	2
Garza grande	44	Topografía	54
Gaviota de franklin	53	Bibliografía	55



Nido con polluelos de Fío-fío

INTRODUCCIÓN

Muchos ni se imaginan la cantidad de vida que hay en estas islas, tan al sur del mundo, ya que parecen solitarias, frías e inhóspitas. Pero sus bosques húmedos y sus bordes son el hábitat perfecto para un gran número de especies de aves.

A través de esta guía les quiero presentar a las aves que habitan y visitan esta hermosa isla y sus alrededores. Con una breve descripción de cada una.

Espero que mediante el conocimiento tomemos conciencia de la importancia de la naturaleza que nos contiene y rodea. Y así nos sintamos incentivados a cuidarla y contribuir en su conservación.

Los invito a recorrer la isla, descubrir las aves, deleitarse y llenar sus corazones con su naturaleza exuberante, flora nativa y paisajes vírgenes.



CHURRíN DEL SUR

Scytalopus magellanicus
MAGELLANIC TAPACULO

Descripción: Mide entre 10 y 12 cm. Plumaje gris oscuro a negro. Pico chico puntiagudo y negro. Patas oscuras.
Hábitat: Bosques húmedos, matorrales, zonas arbustivas densas.

Hábitos: Solitaria, sigilosa y asustadiza. Se mueve como un ratoncito. Canto fuerte. Se alimenta de insectos y larvas. Anida en grietas y hoyos de árboles, pone de 1 a 3 huevos blancos.



CHINCOL

Zonotrichia capensis chilensis
RUFOUS-COLLARED SPARROW

Descripción: Mide de 14 a 16 cm. Corona en punta con cabeza rayada de fondo gris. Nuca rojiza. Dorso pardo con estrías negruzcas. Alas pardas con dos gruesas barras blancas. Blanco por debajo, con parche negro en el pecho al lado de un parche rojizo.
Hembra: Colores más apagados y sin las plumas de la corona levantadas.
Hábitat: Vive en todos los hábitats de playas hasta laderas de cerros rocosas. Campos, huertos y jardines.
Hábitos: Básicamente insectívora. Anida en arbustos, árboles pequeños o matorrales a 1 o 2 metros de altura, aunque a veces lo hace en el suelo escondido en el pasto. El nido lo confecciona con pasto o cualquier sustancia vegetal blanda. Pone por lo general 3 huevos.





RAYADITO

Aphrastura spinicauda
THORN-TAILED RAYADITO

Descripción: Mide de 13 a 15 cm. Cabeza negra, gruesa ceja blanca anaranjada o beige. Mejillas y garganta blancas. Partes superiores café con lomo y alas café rojizas. Partes inferiores blanquecinas. Cola con rectrices centrales café rojizas, laterales con la mitad basal negra y resto café rojizo. Todas las rectrices terminan con la punta desnuda, característica de la cual deriva su nombre específico spinicauda. Pico oscuro, corto y fino.

Hábitat: Zonas boscosas.
Hábitos: Se mueve y trepa rápidamente en pequeños grupos o solitario buscando insectos y larvas extrayéndolas desde los troncos o ramas. Practica un vuelo ondulado, durante la primavera y verano construye su nido en cavidades naturales, generalmente en huecos de árboles. Lo arman con ramitas suaves o pastos y hace una cama con plumas. Ponen por lo general 3 huevos blancos.

CHERCÁN DE LAS VEGAS

Cistothorus platensis
SEDGE WREN

Descripción: Mide de 11 a 12 cm. Cabeza parda con rayas negras. Dorso pardo variegado con rayas negras y blanquecinas. Pecho y abdomen café claro.
Alas primarias negras con borde externo pardo y rayas negras.
Cobertoras pardas con rayitas negras. Cola café con barras anchas oscuras. Pico y patas córneos. Ojos café.
Hábitat: Totorales, vegas, pantanos, prados húmedos, bordes de ríos y similares.
Hábitos: Ave tímida y difícil de ver. Se alimenta de arañas e insectos que captura dentro de su zona. Comportamiento territorial y de pareja. Anida en el suelo en un nido bastante grande construido con el mismo material de su entorno, forrado con plumas, semi techado y bien escondido. Pone entre 4 a 6 huevos completamente blancos.



CHERCÁN

Troglodytes musculus
SOUTHERN HOUSE WREN

Descripción: Mide de 11 a 12 cm.
Cabeza y dorso color canela claro.
Garganta, pecho y abdomen blanquecino acanelado.
Alas canela. Cola larga parda algo rojiza con barras transversales negruzcas, normalmente levantada.
Pico negruzco chico y algo curvado hacia abajo. Patas café. Ojos oscuros.
Hábitat: Casi todos, campos, bosques, matorrales, precordillera, etc.
Hábitos: Se mueve rápidamente entre las ramas en busca de insectos.
Anida en huecos de árboles, cuevas en barrancos, lugares con entrada oscura. En una base de palitos o pasto hace un colchón de plumas, pone de 4 a 7 huevos rosados manchados con tonos rojos a café oscuro. Dos o tres posturas al año.



CARPINTERITO

Veniliornis lignarius
STRIPED WOODPECKER

Descripción: Mide de 18 a 19 cm.
Macho: Cabeza con frente y corona negras, nuca delantera roja. Lados de la cara blancos con banda negruzca que cruza el ojo y llega hasta la zona auricular trasera. Dorso y lomo con barras transversales negras y blancas.
Alas negras con manchas blancas, cubiertas interiores blancas.
Pecho y abdomen blanquecino con tinte amarillento y barritas negruzcas.
Pico corto en forma de cincel.
Hembra: Similar al macho pero sin el rojo de la nuca.
Hábitat: Bosques, matorrales, prados, precordillera huertos y plantaciones.
Hábitos: Se alimenta de gusanos, larvas e insectos que recolecta buscando entre las grietas de troncos o taladrando árboles podridos. Para anidar taladra un agujero y rellena el fondo con el mismo aserrín a modo de colchón protector. Pone de 3 a 4 huevos blancos.



COMESEBO GRANDE

Pygarrhichas albogularis
WHITE-THROATED TREERUNNER

Descripción: Mide 16 cm.
Cabeza, cuello trasero y dorso café oscuro. Lomo, plumas superiores y cola rojizas. Garganta, cuello y pecho blancos. Abdomen con plumas blancas bordeadas de pardo oscuro, predominando más el blanco en la línea media. Alas café oscuro con cubiertas y secundarias bordeadas de rojizo. Plumas largas de la cola sin barbas en las puntas las que quedan como prolongaciones espinosas. Pico ligeramente encorvado hacia arriba.
Hábitat: Zonas boscosas y sus bordes.
Hábitos: Costumbres similares a los carpinteros, posee las puntas de las plumas de la cola sin barbas, semejantes a aguijones y muy tiesas, las cuales le sirven de apoyo mientras sube y corre ágilmente por los troncos y ramas en busca de su alimento. Levanta con su pico la corteza, arrancando pedacitos y líquenes en busca de larvas e insectos. Para anidar hace hoyos en troncos de árboles algo podridos. En su interior coloca aserrín de su mismo trabajo y pajitas secas.
Pone por lo general 3 huevos blancos.



CACHAÑA

Enicognathus ferrugineus
AUSTRAL PARAKEET

Descripción: Mide 35 cm.
Mediana de pico ganchudo y chico que le da a la cara un aspecto apagado. Plumaje verde oliváceo apagado, con puntas de las plumas más oscuras, que hacen que el cuerpo parezca escamoso. Resalta un parche rojo oscuro en la cola, el vientre, la frente y el lorum. Ojo oscuro. Patas cortas
Hábitat: Zonas boscosas, espacios libres y zonas de cultivo, hasta los 2.000 metros de altura.
Hábitos: Normalmente en pequeñas bandadas de menos de 20 individuos. Se alimenta de brotes de Ñire, plantas silvestres, frutos y semillas del bosque nativo, las que al partirlas ayudan a reforestar el suelo en forma natural. Anidan en loreras excavadas en barrancos de montaña o cuestas escarpadas; también en huecos de árboles muertos, o grietas en rocas. De vez en cuando construye su nido de ramitas gruesas en salientes de paredes rocosas; a menudo con pequeñas colonias de crías. Pone de 4 a 6 huevos. A los 26 días nacen los pichones.



FÍO-FÍO

Elaenia albiceps
WHITE-CRESTED ELAENIA

Descripción: Mide 15 cm.
Oliváceo apagado con anillo ocular blanco y dos gruesas barras alares blancas. Parche blanco en el centro de la corona. Partes inferiores color hueso con tinte oliváceo en lados del pecho y a veces algo de amarillo en el área cloacal. Pico negruzco y corto. Alas largas.
Hábitat: Bosques, plantaciones, jardines, huertos.
Hábitos: Se alimenta principalmente de insectos, también come semillas, bayas y brotes tiernos de algunos árboles frutales. Se mueve entre el follaje de los árboles y arbustos. Su característico canto ¨fío-fío¨ lo delata. En invierno migra hacia el Norte. Construye un nido tipo taza, bastante cómodo, hecho de tallos de pasto, hojas, musgos o líquenes forrado con plumas, en arbustos tupidos, helechos o en bifurcaciones de ramas no muy altas. Pone de 2 a 3 huevos blancos con pintas rojizas.



COLILARGA

Sylviorthorhynchus desmursii
DES MURS´WIRETAIL

Descripción: Mide 24 cm.
Cola el doble de larga que el cuerpo que es más bien chico y redondo. La cola posee 6 plumas finas, siendo las dos centrales especialmente largas.
De color pardo cálido con ceja clara y fina. Pico en forma de pinza.
Hábitat: Matorral denso, zonas húmedas y tupidas de bosque.
Hábitos: Ave tímida, se mueve rápida y ágilmente entre las ramas de arbustos y matorrales donde se alimenta de insectos. El nido con forma de bola casi redonda posee una entrada lateral. Está hecho con pasto seco y forrado con plumas suaves.
Pone 3 huevos blancos bastante grandes.



JILGUERO

Sporagra barbata
BLACK CHINNED SISKIN

Descripción: Mide de 13 a 14 cm. Cabeza amarilla verdosa, más oscura hacia la nuca y corona negra. Cuello amarillo verdoso con la parte delantera y garganta negra. Dorso amarillo verdoso oscuro con rayas negruzcas. Pecho amarillo verdoso y abdomen más blanquecino. Alas negruzcas con dos barras amarillas y parche amarillo. Hembra: Similar al macho pero sin la corona ni la garganta negra. Partes inferiores menos amarillentas y más verdosas.

Hábitat: Zonas de matorrales y arboladas.

Hábitos: En bandadas de hasta 100 individuos. Se alimenta en los árboles, dentro del follaje y en el suelo, principalmente de semillas.
Anida en árboles, construye un nido tipo taza abierta hecho con pastos, musgos, fibras, forrado con plumas y lanas. Pone de 4 a 6 huevos blancos con un poco de celeste y a veces con pequeñas pintas café.



PEUQUITO

Accipiter chilensis
CHILEAN HAWK

Descripción: Mide de 37 a 42 cm. Partes superiores pardo negruzcas. Pecho y abdomen gris ceniza claro con bandas anchas oscuras. Garganta blanquecina rayada de oscuro.
Alas del tono de las partes superiores relativamente cortas y redondeadas. Calzones café rojizos. Cola larga, parduzca con 5 o 6 bandas negruzcas. Patas amarillas. Ojos amarillos.

Hábitat: Quebradas con bosque nativo denso, en la precordillera andina, en la serranía costera y en los cordones montañosos transversales.

Hábitos: Vuela muy rápido entre el bosque, puede pasar por espacios muy reducidos, realizando virajes bruscos y cerrados a alta velocidad para atrapar a sus presas con sus fuertes garras. Se alimenta de aves como el rayadito, el jilguero, el fío-fío, el zorzal, el diucón y la torcaza.
Anidan en la parte alta de un árbol, el nido es construido con ramitas de trama firme y forrado con pasto seco muy bien tejido y redondeado.



TORCAZA

Patagioenas araucana
CHILEAN PIGEON

Descripción: Mide de 35 a 37 cm. La paloma más grande de Chile, fornida y pechugona, de cola larga. Plumaje oscuro de color vinoso con coberteras alares gris oscuro. Puntas de las alas negras. Cola en forma de abanico, gris con ancha banda subterminal negra y banda terminal mas clara. Franja blanca en la nuca que bordea por arriba un área verde iridiscente. Pico negro. Patas rojas. Ojos rojos.
Hábitat: Zonas boscosas.
Hábitos: Normalmente en pequeñas bandadas. Se posan quietas en el follaje. Se alimenta de frutos de árboles, como Lingue, Boldo y Maqui. Anida en árboles no muy altos. Construye una plataforma de palitos rudimentaria. Pone 1 huevo blanco.



GOLONDRINA CHILENA

Tachycineta meyeni
CHILEAN SWALLOW

Descripción: Mide de 13 a 14 cm. Superficie dorsal azul oscura con brillo metálico y con notable mancha blanca que va desde la parte inferior del lomo hasta las alas. Partes inferiores blancas con leve tinte grisáceo en el pecho y flancos. Alas largas y delgadas. Cola levemente ahorquillada de color negro con algo de brillo metálico verdoso. Pico de color negro, corto y ancho en la base. Patas negras.
Hábitat: Campo, playas, ciudades.
Hábitos: Se alimenta de insectos voladores que captura al vuelo ágilmente. Se mueve en pequeñas bandadas. Anida en cavidades naturales como huecos de árboles y riscos. Forra el nido con plumas dejando la entrada estrecha. Pone de 3 a 5 huevos de color blanco.



CACHUDITO

Anairetes parulus
TUFTED TIT-TYRANT

Descripción: Mide 11 cm.
Una de las aves más pequeñas del país. Cabeza negra. Cresta negra que se riza hacia adelante semejante a unos cachitos. Frente, zona auricular y nuca con líneas longitudinales blancas. Dorso gris algo oliváceo. Pecho y abdomen blanquecino con líneas negras, a veces con tinte amarillento. Alas y cola negruzcas con bordes claros.
Pico negro. Patas negras. Iris blanco amarillento.
Hábitat: Bosques, matorrales, valles y laderas, zonas forestales, jardines.
Hábitos: De movimientos rápidos y ágiles, recorre cortezas de árboles y arbustos. Baja al suelo para buscar insectos, entre troncos y ramas caídas, que son su alimento principal aunque también come semillas. Suele encontrarse en pequeñas bandadas.
El nido lo construye en arbustos, tipo taza. Está hecho de líquenes, fibras de raíces y pastos, muy bien forrado con plumas. Pone por lo general 3 huevos de color crema amarillento.



TRARO

Caracara plancus
SOUTHERN CARACARA

Descripción: Mide de 49 a 65 cm.
Silueta robusta. Corona plana distintiva, negra con plumas traseras levantadas similares a un moño. Mejillas, garganta y cuello cremosos. Base del cuello, pecho y manto pardo oscuro con estrías transversales cremosas. Lomo y pantalones pardo oscuro. Alas y cola blanquecinas con muchas barras transversales pardas. Ala con punta negra. Cola con punta parda.
Gran pico amarillento con base gris y cara anaranjada. Patas amarillas.
Hábitat: Bosques, campos abiertos, zonas de matorrales.
Hábitos: Grito ronco, semejante al ladrido de un perro. Alimentación carnívora carroñera, come ratones, pollos de aves, culebras, sapos y otros animales semejantes. También animales muertos.
No se lanza a atacar a sus presas, las corretea desde el suelo hasta alcanzarlas. Normalmente anida en árboles altos. Nidos voluminosos, una gran taza hecha de palos secos forrados con pasto blando o lana.
Pone por lo general 2 huevos de color crema a rosado manchados con rojo oscuro.



CHUNCHO

Glaucidium nanum
AUSTRAL PIGMY OWL

Descripción: Mide de 20 a 21 cm. Pequeño, con cabeza grande y cola corta, ojos grandes y amarillos. Pico verde amarillento corto y ganchudo. Finas estrías en la corona. Plumaje pardo con algo de castaño y manchitas claras. Blanquecino por debajo con pecho oscuro y vientre rayado con líneas longitudinales en las partes inferiores.
Hábitat: Llanuras de la costa, precordillera, bosques.
Hábitos: Aunque de costumbres más diurnas que otras aves de su tipo, el Chuncho es difícil de ver por su pequeño tamaño, su vuelo silencioso y su inmovilidad en la rama donde se posa. Se alimenta de aves, insectos, mamíferos y reptiles.
Agresivo y feroz, caza animales incluso más grandes que él, matándolos rápidamente con sus pequeñas pero poderosas garras.
Anida en huecos de árboles, pone de 3 a 5 huevos blancos.



DIUCÓN

Xolmis pyrope
FIRE-EYED DIUCON

Descripción: Mide 21 cm.
Pico negro. Iris rojo. Partes superiores gris oscuro. Alas primarias y secundarias casi negras. Cobertoras gris oscuro. Cola gris clara con bordes externos blancos. Garganta blanquecina. Pecho gris claro. Patas negruzcas.
Hábitat: Terrenos abiertos con arbustos y árboles, en la costa, valle central y precordillera.
Hábitos: Solitario, en pareja o pequeños grupos. Se posa en partes altas de los árboles o arbustos.
Se alimenta principalmente de insectos grandes aunque también come frutos silvestres.
Anida en árboles a unos 2 o 3 metros del suelo. El nido tiene forma de taza, construido de palitos y pasto seco forrado con musgos u otra especie suave. Pone de 2 a 3 huevos blanco cremoso con manchitas rojizas.



VIUDITA

Colorhamphus parvirostris
PATAGONIAN TYRANT

Descripción: Mide de 12 a 14 cm. Cabeza gris parduzca y lados de la cara grisáceos. Dorso y lomo pardo oliváceos. Garganta y pecho grisáceos. Abdomen grisáceo lavado de amarillento. Alas pardo negruzcas con dos llamativas barras acaneladas. Cola pardo negruzca. Pico negro, corto y fino. Patas negras.
Hábitat: Bosques y sus bordes, cercanías de agua, matorrales, valles y quebradas de la precordillera.

Hábitos: Generalmente solitaria, difícil de ver pero fácil de escuchar su canto melancólico. Pasa bastante tiempo entre el follaje de los árboles volando distancias cortas para alimentarse atrapando insectos. Nidifica en arbustos a 1 o 2 metros del suelo, construye un nido compacto y alargado, por fuera revestido con musgos y por dentro con pastos verdes colocados en forma circular. Pone 3 huevos blancos con pintas rojizas.



TORDO

Curaeus curaeus
AUSTRAL BLACKBIRD

Descripción: Mide de 24 a 28 cm. Completamente negro brillante. Pico negro, largo y en punta. Patas negras.
Hábitat: Laderas, quebradas con bastante vegetación, bordes de bosques, lomas abiertas.
Hábitos: Se alimenta en grupos pequeños, principalmente en el suelo. Pero puede consumir néctar de las flores y atrapar insectos de ramas y cortezas. Ruidoso. Construye un nido grande de tallos, palitos y otros vegetales unidos con barro. Generalmente muy bien escondido en la parte baja de los matorrales. Pone de 3 a 5 huevos alargados, celeste pálido y azulino, con una que otra pinta negra fina.

COMETOCINO PATAGÓNICO

Phrygilus patagonicus
PATAGONIAN SIERRA-FINCH
Endemico de Patagonia

Descripción: Mide de 14 a 16 cm. Cabeza, cuello y parte superior del cuello gris azulado, similar a un capuchón. Alrededor del pico y lorums negruzcos. Dorso amarillo oliváceo con tonos castaños. Lomo amarillento. Pecho y abdomen amarillo verdoso. Plumas pequeñas que cubren la base por la parte inferior del cuerpo gris azulado. Primarias negruzcas. Alas y cola gris azulado.
Hembra: Cabeza y cuello más claros. Alas y cola grisáceas. Dorso verde oliváceo oscuro. Partes inferiores verde amarillento pálido.
Hábitat: Salientes rocosas. Laderas y quebradas muy vegetadas con arbustos semilleros. Áreas boscosas, también en jardines y cerca de zonas urbanas.
Hábitos: En parejas o pequeños grupos. Muy activo generalmente en las zonas medias altas del follaje donde se alimenta y canta.
Anida en lugares de vegetación densa cerca de raíces o barrancos, el nido es tipo taza, construido con material vegetal blando y forrado con pelos u otro material suave. Pone de 2 a 4 huevos de color verde pálido con manchitas grises y pardo-violáceas hacia el polo más ancho del huevo.





QUETRU NO VOLADOR

Tachyeres pteneres
MAGELLANIC FLIGHTLESS
STEAMER DUCK

Descripción: Mide de 78 a 83 cm.
Pato grande y voluminoso, de cuerpo macizo. Cabeza y pico grandes.
Alas cortas y gruesas. Pico anaranjado brillante de base ancha y gancho negro.
Plumaje del cuerpo gris, de apariencia escamosa. Linea postocular clara.
Cola corta en punta. Macho bastante más grande que la hembra.
Hábitat: Marino, canales del sur.

Hábitos: No vuela. Corre sobre el agua, aleteando. Excelentes zambullidores.
Se alimenta en las costas rocosas de peces y crustáceos, preferentemente durante la marea alta. En parejas o en familias. Anidan en zonas de vegetación tupida, cercana a la costa, en el suelo.
Nido poco elaborado. Base y reborde de plumón. Pone de 5 a 8 huevos.



ZORZAL

Turdus falcklandii magellanicus
AUSTRAL THRUSH

Descripción: Mide de 23 a 29 cm.
Gris por encima, cabeza negruzca.
Garganta blanca con estrías negruzcas.
Pecho grisáceo. Patas y pico amarillo.
Ojos pardos, párpado amarillo.
Hembra: mas parda por encima, con cabeza más clara.
Hábitat: Campos, praderas, parques, tierras cultivadas y bosques abiertos.
Hábitos: Se oculta en el follaje. Su alimento predilecto son las lombrices, caracoles y otros animales de cuerpo blando por lo que es muy común verlos en planicies con césped corriendo de un lado a otro en busca de ellos.
También se alimenta de algunos frutos maduros.
Su nido es bastante grande, forrado con pasto y barro, escondido entre el follaje de arbustos o árboles a 2 o más metros de altura. Pone de 2 a 4 huevos azulados con pintas café-rojizas.



PITÍO

Colaptes pitius
CHILEAN FLICKER

Descripción: Mide de 32 a 34 cm. Cabeza pardo oscuro. Auriculares, mejillas y garganta café leonado. Dorso y cubiertas alares pardo oscuro ribeteadas de blanco. Lomo blanco. Pecho blanquecino con barras negruzcas. Abdomen un poco amarillento. Cola oscura. Pico negro. Alas redondeadas. Ojo amarillo.
Hábitat: Desde la zona costera hasta la precordillera, faldeos de cerros y campos abiertos.
Hábitos: Vuelo ondulante, su característico grito ¨pitío-pitío-pitío¨ lo identifica claramente. Se alimenta en el suelo y en las cortezas de los árboles y arbustos, a los cuales golpea con su pico, perforando la madera, para introducir su lengua cilíndrica y capturar insectos y larvas. Anida en hoyos de barrancos y laderas en donde cava un hoyo profundo. Pone de 5 a 6 huevos.



ZARAPITO

Numenius phaeopus hudsonicus
WHIMBREL

Descripción: Mide de 42 a 45 cm. Plumaje pardo con patrón oscuro de motas y orlas en las partes superiores. Corona con línea blanquecina en el centro. Cejas blanquecinas. Beige por debajo con estrías. Alas pardas. Cola parda con bandas más oscuras. Patas grises. Pico largo y curvado hacia abajo. Ojos pardos.
Hábitat: Zonas costeras y desembocaduras de ríos.
Hábitos: Vive en bandadas, se mueve entre la arena y las rocas buscando su alimento que consiste en pulgas de mar, crustáceos, larvas y lombrices. Es una especie que emite un fuerte sonido al sentirse amenazada y emprender el vuelo.
Al terminar el verano austral comienza un largo viaje hacia el otro extremo de América.



PINGÜINO DE MAGALLANES

Spheniscus magellanicus
MAGELLANIC PENGUIN

Descripción: Mide 70 cm.
Negro por encima, blanco por debajo. Línea blanca que sube desde el cuello por detrás de la zona auricular y sobre el ojo, hasta la frente sin encontrarse sobre el pico. Collar negro en el cuello y "U" negra invertida sobre el pecho y flancos blancos. Pico robusto y grueso de base negra con línea rosada difusa. Ojo rodeado de rosado. Patas gris oscuro. Las alas están altamente modificadas, habiendo perdido las largas plumas características de las alas de un ave, para formar una paleta tiesa cubierta de pequeñísimas plumas duras, que usan para nadar; sus pies y la cola muy corta se combinan para actuar de timón. Los huesos son sólidos y pesados, ayudándolos para permanecer sumergidos y reducir la energía necesaria para el buceo. Son capaces de resistir el frío extremo ya que estan provistos de un abrigo impermeable formado por plumas cortas y muy densas. Además, una capa gruesa de grasa, también les sirve tanto de aislante contra el frío como almacén de energía. Estas adaptaciones les permiten minimizar la pérdida de calor en las aguas heladas.
Hábitat: Pelágico, costero e islotes rocosos.
Hábitos: Son aves altamente sociables que pueden encontrarse en colonias, a veces muy grandes. Se comunican por un comportamiento ritual complejo, como por ejemplo, un movimiento ondulante de la cabeza, llamado, inclinación, gesticulación y acicalamiento de plumas. Las disputas territoriales conducen a posturas agresivas tales como miradas fijas al oponente, indicaciones, cargas y golpes con las aletas. Se alimenta principalmente de anchovetas y sardinas complementando con crustáceos, calamares y sepias. Nidifica en playas, dunas, colinas e islas. Nidos en galerías en donde sea posible cavar, también entre arbustos. Pone 2 huevos, a veces 1.



BLANQUILLO

Podiceps occipitalis
SILVERY GREBE

Descripción: Mide 27 cm.
Coloración general gris ceniza. Partes inferiores blancas. Fino pico curvado hacia arriba y ojos rojos brillantes.
En plumaje reproductor presenta una llamativa mancha auricular de plumas doradas.
Hábitat: Bahías, lagos, lagunas, ríos tranquilos.

Hábitos: Solitaria o en bandadas de 20 ejemplares.
Ave zambullidora, obtiene todo su alimento bajo el agua consistente en plantas, pequeños peces, sus huevos y crustáceos. Construye un nido flotante hecho de totoras anclado a plantas acuáticas, pone de 4 a 6 huevos de color blanco azulado.



TIUQUE

Milvago Chimango
CHIMANGO CARACARA

Descripción: Mide de 37 a 40 cm.
Manto y lomo con plumas café canela bordeadas blanquecinas. Garganta, pecho, abdomen y vientre café claro. Cabeza café oscura. Alas café con franja blanquecina en la mitad. Cola café claro con franja terminal café oscura. Ojos café. Pico color cuerno.
Hábitat: Bordes de agua, lomas, campos, pueblos y ciudades.

Hábitos: Se alimenta preferentemente de insectos, babosas, gusanos o larvas. También peces pequeños, camarones, sapos e incluso carroña. Bullicioso, agresivo y territorial.
Construye un nido tipo taza profunda con ramas secas y forrado con materiales blandos en árboles bajos. Pone de 2 a 4 huevos de color cremoso con manchas rojizas.



COLEGIAL

Lessonia rufa
AUSTRAL NEGRITO

Descripción: Mide de 12 a 13 cm. Macho: Totalmente negro, excepto la parte superior de la espalda y escapulares que son de un tono castaño rojizo. Cola corta. Patas largas. Pico chico y alas más bien redondeadas. Hembra: Partes superiores café tierra. Dorso con mancha rojiza pálida. Partes inferiores gris ceniza. Cola negra.
Hábitat: Tierras bajas y pantanosas, lechos de ríos, orillas de lagos, lagunas, y bordes costeros.

Hábitos: Esencialmente terrestre, corre y camina en busca de su alimento consistente en insectos y larvas. Sus vuelos suelen ser cortos. Se posa en arbustos bajos. Nidifica en el suelo en un nido tipo taza abierta hecho de ramas pequeñas, raíces y pastos entrelazados, forrado con plumas; muy escondido por algún arbusto a ras de suelo o en algún desnivel tapado con vegetación. Pone 3 huevos blancos con manchas oscuras formando un anillo.



CARPINTERO

Campephilus magellanicus
MAGELLANIC WOODPECKER

Descripción: Mide de 38 a 45 cm. De aspecto grande y fuerte. Macho: Negro con brillos azulados. Cabeza con cresta, garganta y cuello totalmente rojos. Cara inferior de las alas blancas. Dos franjas blancas en el dorso debido a las puntas de las alas terciarias y secundarias internas de color blanco. Pico negruzco y recto con punta de cincel. Hembra: Similar al macho pero con la base del pico roja y la cabeza negra con crestas largas y rizadas.
Hábitat: Zonas boscosas.
Hábitos: Su presencia es delatada por un fuerte y penetrante grito semejante a una carcajada o por el fuerte martilleo del pico en algún tronco, especialmente si esta podrido, en donde busca su alimento consistente en gusanos, larvas y otros insectos. Su género, Campephilus, en consecuencia significa "el que ama las larvas". Normalmente, el macho y la hembra viajan juntos o en un grupo familiar de unos tres a cinco pájaros. Anida de preferencia en troncos verticales podridos en donde taladran un hoyo redondeado a unos 15-20 metros de altura. Ponen por lo general 1 o 2 huevos blancos. Ambos padres comparten la crianza.



FARDELA NEGRA

Puffinus griseus
SOOTY SHEARWATER

Descripción: Largo 40 a 46 cm. Envergadura 94 a 105 cm.
De tono pardo grisáceo oscuro en todo el cuerpo. Esbelta y de alas angostas. Las alas lucen por debajo un reflejo plateado. Mantiene la cola cerrada al vuelo y parece puntiaguda. Pico largo, delgado y negro. Patas negras.
Hábitat: Zona costera y altamar.
Hábitos: Casi siempre en grandes cantidades. Vuela batiendo profunda y rápidamente las alas. Se alimenta de peces y crustáceos. Para anidar excavan cuevas en terrenos blandos y tratan de que la entrada quede tapada por algún arbusto. Los huevos son blancos.
El nombre local de "YEGUA" se debe a que cuando pescan en bandadas, lo hacen gritando alrededor del cardúmen, de forma similar a una manada de caballos en una trilla.



ALBATROS DE CEJA NEGRA

Thalassarche melanophrys
BLACK-BROWED ALBATROSS

Descripción: Largo 88 cm. Envergadura 224 cm. Pico amarillo de punta anaranjada. Cabeza y cuerpo blancos. Ceja negra. Supralares pardo oscuro tono que continúa por el dorso. Cola parda. Patas amarillentas o rosado pálidas.
Hábitat: Pelágica.
Hábitos: Vive unos 50 años, formando parejas relativamente estables. Anidan en islas cerca del Cabo de Hornos. Ponen 1 huevo durante octubre, cuya incubación dura entre 68 y 72 días, eclosionando en diciembre. Cuatro meses se demoran los jóvenes en independizarse, para irse alrededor del mes de mayo a altamar por 6 o 7 años y luego volver, ya adultos, a nidificar a dicha isla.





CORMORÁN IMPERIAL

Phalacrocorax atriceps
IMPERIAL CORMORANT

Descripción: Mide 75 cm.
Frente, corona, nuca, cuello trasero, dorso y lomo negros. Garganta, mejillas, cuello delantero, pecho y abdomen blancos. Alas negras con mancha blanca en las cobertoras menores. Cola negra. Pico córneo con carnosidad entre éste y la frente amarilla. Patas rosadas. Ojos azul cobalto.
Hábitat: Zonas costeras y sus islas. También en aguas interiores.

Hábitos: Vuela en formación lineal, a baja altura y aleteando rápido. En pequeños grupos y asociado con otros cormoranes. Descansa sobre rocas. Anida en las cimas o zonas planas de islotes o en rocas rodeadas de agua y de difícil acceso, armando su nido con tiras de plantas marinas y los agrupa uno casi encima de los otros. Ponen de 2 a 4 huevos.

YECO

Phalacrocorax brasilianus
NEOTROPIC CORMORANT

Descripción: Mide de 60 a 73 cm.
Ave marina grande con cuello y cuerpo negro y alargado. Pico café con punta ganchuda. Piel desnuda amarilla oscura alrededor del pico. Patas negras.
Hábitat: Acuático, costas, ríos, lagos, zonas pantanosas, etc.
Hábitos: Nada perfectamente sumergiendo casi todo su cuerpo. Se alimenta buceando, principalmente de peces. Sus plumas no son impermeables, por ello, al salir a descansar, se paran con las alas abiertas para secarlas.
Cría en colonias, en árboles, construye un nido básico con palos y ramas secas y poco forro. Pone de 3 a 4 huevos blancos.



JOTE DE CABEZA NEGRA

Coragyps atratus
BLACK VULTURE

Descripción: Mide 70 cm.
Buitre grande. Coloración general negro, con brillo metálico. Cabeza y cuello desnudos. Alas grisáceas por debajo. Pico negro ganchudo. Patas negras.
Hábitat: Costas, valles y ciudades de tierras bajas.

Hábitos: Carroñero. Excelente planeador. Aprovecha las corrientes para mantener un largo vuelo sin aletear.
Anida en cuevas de los cerros.
Pone 2 huevos blancos con pintas rojizas o lilas.



JOTE DE CABEZA COLORADA

Cathartes aura
TURKEY VULTURE

Descripción: Mide 71 cm.
Cuerpo negro. Cabeza y cuello desnudos rojos. Cola y alas por debajo gris. Pico color cuerno. Ojos rojos. Patas rosadas.
Hábitat: De la costa a la cordillera, hasta 2.000 metros de altitud.
Hábitos: Carroñero. Excelente planeador. Aprovecha las corrientes para mantener un largo vuelo sin aletear.
Se suele ver solo o en parejas.
Anida en cuevas de los cerros, debajo de matorrales, quebradas o entre troncos caidos en los bosques.
Por lo general pone 2 huevos.





GARZA GRANDE

Ardea alba
GREAT EGRET

Descripción: Mide 85 cm.
Garza grande de cuerpo delgado y cuello largo. Completamente blanca. Pico puntiagudo amarillo. Patas negras largas.
Hábitat: Partes bajas de lagos, lagunas y esteros. Borde costero.
Hábitos: Solitaria, en pareja o pequeños grupos. Se observa posada en las orillas inmóvil mientras caza peces, sapos, camarones. Duerme en las ramas de los árboles. Anida entre la vegetación alta, totorales o en riscos; formando el nido con palos entrelazados con juncos y totoras. Pone de 3 a 5 huevos de color celeste claro.

GARZA CHICA

Egretta thula
SNOWY EGRET

Descripción: Mide 50 cms.
Totalmente blanca. Pico negro con base amarilla y cuello largo. Piernas largas negras por delante y amarillas por detrás. Patas amarillas. Ojos amarillos. Plumas largas en la cabeza, dorso y pecho.
Hábitat: Orillas y bordes de ríos, lagos y lagunas, tranques, esteros y pantanos. Bordes costeros.
Hábitos: Casi nunca anda sola, normalmente en pareja o en bandadas. Tímida. Se alimenta de peces y crustáceos. Nidifica en árboles, riscos o totorales. Pone de 3 a 5 huevos celeste claro.



HUAIRAVO

Nycticorax nycticorax obscurus
BLACK CROWNED NIGHT HERON

Descripción: Mide 57 cm.
Cabeza, dorso y lomo negruzcos con brillo metálico tornasolado azul y verde.
Frente, cara y partes superiores del pecho blanco, variando hacia el gris en las partes inferiores.
Alas grises y pico amarillo muy oscuro.
Patas amarillas e iris rojo notable.
Presenta 2 o 3 plumas blancas que salen desde la nuca no siempre visibles.

Hábitat: Lagos, lagunas, ríos, vegas, esteros y mar.
Hábitos: Vuelo lento y pausado. Crepúscular y nocturno. Se alimenta de crustáceos, peces y ranas desde los roqueríos. Anida en ramas de árboles, totorales o acantilados.
El nido es de palitos secos entrelazados y poco forro. Pone de 2 a 3 huevos celestes.



GARZA CUCA

Ardea cocoi
COCOI HERON

Descripción: La garza chilena más grande, mide 120 cm. Básicamente gris a gris azulada. Cabeza y cuello blanquecino. Cuello blanco en contraste con llamativa corona negra. Muslos y área cloacal blancos. Pico amarillento. Patas negruzcas.
Habitat: Orillas de lagos, lagunas, ríos, embalses, tranques y playas marinas.
Hábitos: Muy esquiva y arisca. Aleteo pausado y elegante. Se alimenta de peces, larvas de insectos acuáticos, ranas y renacuajos que caza a orillas de aguas. Solitaria, de hábitos nocturnos. Durante el día puede pasar horas parada sobre la rama de un árbol. Rara vez anda en pareja.
Anida sobre árboles, construyendo un nido de palos secos.
Pone de 2 a 4 huevos celestes.





CANQUÉN

Chloëphaga poliocephala
ASHY-HEADED GOOSE

Descripción: Mide de 50 a 55 cm. Pequeño de cabeza gris azulada en contraste con cuello y pecho rojizos, partes superiores gris oscuro. Pequeñas medias lunas blancas en el ojo. Pico negro y chico. Partes inferiores blancas, con barras blanquinegras en los flancos y área cloacal rojiza. Cola negra. Patas negras por delante y anaranjadas por detrás.
Hábitat: Pantanos boscosos, humedales cercanos a bosques de Nothofagus.
Hábitos: Se alimenta de vegetales y plantas acuáticas. Es gregario, construye un nido de pasto semitechado y forrado con plumas suaves. Pone de 5 a 7 huevos.

CHURRETE CHICO

Cinclodes oustaleti
GREY FLANKED CINCLODES

Descripción: Mide de 17 a 18 cm. Pequeño, de pico negruzco, chico y fino. Vientre blanquecino o gris claro y tono parduzco en flancos traseros. Ceja blanquecina y corona gris. Partes inferiores grisáceas con estrías blancas. Garganta blanca que contrasta con el pecho oscuro. Ojos oscuros.
Hábitat: Bordes de esteros, mar, lagos, lagunas y riachuelos.
Hábitos: Solo o en pareja. Se alimenta de artrópodos (arácnidos, insectos, crustáceos, ciempiés, milpiés), que captura en el suelo, pasto o rocas. Nidifica en grietas o cuevas de barrancos al borde de riachuelos, hace una taza de fibras vegetales que cubre con grasa y pelos. Pone de 2 a 3 huevos blancos.



LILE

Phalacrocorax gaimardi
RED-LEGGED CORMORANT

Descripción: Mide de 60 a 76 cm. Grande de cuello y cuerpo alargado. Gris con notoria mancha blanquecina en los lados del cuello. Pecho y abdomen gris más claro. Alas oscuras. Pico amarillo con base rojo-anaranjada. Patas rojo-anaranjadas.

Hábitat: Costa e islas, zonas rocosas.
Hábitos: Vuela cerca del agua, normalmente solo, no en bandadas. Cría en colonias en acantilados, construye su nido con huiros y algas. Pone por lo general 3 huevos blancos.



BANDURRIA

Theristicus melanopis
BLACK FACED IBIS

Descripción: Mide 73 cm. Cabeza y cuello amarillento ocre y nuca más oscura. Pecho blanquecino separado del cuello por una línea gris. Lados del pecho y abdomen negros. Dorso pardo grisáceo. Cubiertas alares menores y medianas blancas con bordes grises oscuros; las mayores blanco grisáceas. Primarias negras. Ojos y garganta desnuda de color negro. Pico largo curvado hacia abajo, negro la mitad basal y córneo el resto. Iris y patas rojas a rosadas.

Hábitat: Zonas pantanosas y orillas de lagos, lagunas y playas. También en campos.
Hábitos: Se alimenta de sapos, renacuajos, lombrices e insectos. Por lo general en bandadas. Anida en grietas o salientes de riscos en cerros interiores, acantilados costeros y en árboles. El nido está hecho de palos secos y tallos de pasto, muy voluminoso y mal terminado. Pone de 2 a 3 huevos blancos con pintas café.



GAVIOTA DOMINICANA

Larus dominicanus
KELP GULL

Descripción: Mide de 60 a 62 cm. La gaviota más grande de sudamérica. Cabeza, cuello, abdomen y cola blancos. Manto y lomo negros. Pico amarillo con mancha roja en la mandíbula inferior. Patas gris verdoso claro. Párpados rojos.
Hábitat: Zonas costeras e interior de ríos.

Hábitos: Se alimenta de peces, mariscos y crustáceos. Huevos y polluelos de otras especies e incluso de su misma especie.
Anidan en zonas planas en islas rocosas o acantilados costeros. Ponen de 2 a 3 huevos color crema verdoso con manchas negras o café oscuras.



GAVIOTA DE FRANKLIN

Leucophaeus pipixcan
FRANKLIN´S GULL

Descripción: Mide de 36 a 38 cm. Cabeza grisácea jaspeada de blanco con la corona negruzca hasta el ojo; anillo periocular blanco. Manto y cobertoras grises. Cuello y partes inferiores blancas. Alas externas grises con punta blanca. Cola blanca. Pico negruzco. Patas café oscuro rojizas.
En época de reproducción cambia de colores: Cabeza negra, pico rojo y tonalidad rosada en partes inferiores.
Hábitat: Costas, lagos, ríos, campos, basurales.
Hábitos: Generalmente en bandadas. Se alimenta de insectos, animales marinos y lombrices. Anida en colonias. Pone de 2 a 3 huevos moteados.

TOPOGRAFÍA







BIBLIOGRAFÍA

Aves de Chile; Álvaro Jaramillo.
Aves de la Patagonia Tierra del Fuego y Península Antártica;
Enrique Couve y Claudio Vidal.
www.avesdechile.cl

Corrección de texto: Claudia Godoy M. Diseño: Laura Mena G.
Fotografía: Fernanda Neder. Retoque digital: Claudio Perez L.
www.islajechica.cl

